

The effect of different concentrations of salicylic acid on the pigments content, rutin and quercetin in pepper (*Capsicum annuum*)

Kobra Mahdavian

Department of Biology, Payame Noor University, 19395-3697 Tehran, I. R. of Iran

Abstract

Salicylic acid is an antioxidant which has been used in recent years to increase the resistance of plants to deal with stresses. In this study different concentrations (0.1, 1.5, 3, 6 and 9 mM) of salicylic acid were investigated on the quantity of fresh and dry weight, chlorophyll, carotenoid, malon di aldehyde, flavonoids, rutin and quercetin in pepper (*Capsicum annuum*). After 5 weeks, plants were treated with different concentrations (zero, 0.1, 1.5, 3, 6 and 9 mM) of salicylic acid. The results showed that concentrations of 0.7, 1.5 and 3 mM of SA increased fresh and dry weight, chlorophyll a, b, total and carotenoid content, but concentrations 6 and 9 mM of SA decreased fresh and dry weight, chlorophyll a, b, total and carotenoid content. Concentrations of 1.5 and 3 mM of SA decreased malon dialdehyd and other aldehyde content, but concentrations 6 and 9 mM of SA increased malon dialdehyd and other aldehyde content. Concentrations of 0.1, 0.7, 1.5 and 3 mM SA caused significant increase in total flavonoids in treated leaf. The results showed that under our experimental conditions different concentrations (0.7, 1.5 and 3mM) of salicylic acid increased rutin and quercetin content. In general, according to the results, treatment of salicylic acid in low concentrations has positive effects and high concentrations has negative effects on the growth of the pepper plant.

Key words: Rutin, pigment, Salicylic acid, *Capsicum annuum* L., Quercetin, malon di aldehyde

* mahdavian.k@gmail.com

اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر مقدار رنگیزه‌ها، روتین و کوئرستین در گیاه فلفل (*Capsicum annuum*)

کبری مهدویان *

گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، ایران

چکیده

سالیسیلیک اسید یکی از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که در سال‌های گذشته برای افزایش مقاومت گیاهان در مقابله با تنش‌ها به کار گرفته می‌شود. در پژوهش حاضر، نقش غلظت‌های مختلف صفر، ۰/۱، ۰/۷، ۱/۵، ۳، ۶ و ۹ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید بر وزن تر و خشک، کلروفیل، کاروتنوئید، مالون‌دی‌آلدئید، فلاونوئید، روتین و کوئرستین گیاه فلفل (*Capsicum annuum* L.) بررسی شدند. گیاهان پس از گذشت ۵ هفته، با غلظت‌های ۰/۱، ۰/۷، ۱/۵، ۳، ۶ و ۹ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید تیمار شدند. نتایج نشان داد که در شرایط آزمایش، غلظت‌های ۰/۷، ۱/۵ و ۳ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید؛ وزن تر و خشک، کلروفیل a و b، کلروفیل کل و کاروتنوئید را افزایش دادند؛ اما غلظت‌های ۶ و ۹ میلی‌مولار، کاهش این شاخص‌ها را سبب شدند. غلظت‌های ۱/۵ و ۳ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید، مقدار مالون‌دی‌آلدئید و سایر آلدئیدها را کاهش دادند؛ اما غلظت‌های ۶ و ۹ میلی‌مولار مقدار آن‌ها را افزایش دادند. مقدار فلاونوئیدهای کل در طول موج‌های ۲۷۰، ۳۰۰ و ۳۳۰ نانومتر در برگ‌های تیمار شده با غلظت‌های ۰/۱، ۰/۷، ۱/۵، ۳ و ۶ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید افزایش معنی‌دار نشان دادند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که غلظت‌های ۰/۱، ۰/۷ و ۱/۵ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید، مقدار روتین و کوئرستین را افزایش دادند. به‌طور کلی نتایج بررسی حاضر نشان داد که تیمار سالیسیلیک اسید در غلظت‌های اندک، آثار مثبت و در غلظت‌های زیاد، آثار منفی بر رشد و نمو گیاه فلفل دارد.

واژه‌های کلیدی: رنگیزه، روتین، سالیسیلیک اسید، فلفل، کوئرستین، مالون‌دی‌آلدئید.

مقدمه

فنلی هستند. در روزگاران قدیم از سالیسیلیک اسید

استفاده دارویی می‌شده است. سالیسیلیک اسید یک

ترکیب فنیل پروپانوئیدی است که استقامت گیاهان را

سالیسیلیک اسید یا اورتو هیدروکسی بنزوئیک اسید

و ترکیبات مربوطه متعلق به گروه متنوعی از ترکیبات

تحریک دستگاه‌های فتوسنتزی و افزایش کلروفیل را در سویا موجب شده است (Leslie and Romani, 1988؛ Zhao *et al.*, 1995). تنش‌های زیستی و غیرزیستی، القای پاسخ دفاعی را در گیاهان باعث می‌شوند. سازوکارهای دفاعی مختلفی وجود دارند. یکی از این سازوکارها تولید فلاونوئیدها است که نقش‌های متنوعی در فیزیولوژی، بیوشیمی و تغذیه انسان دارند (Martens and Mithofer, 2005). روتین و گلیکون کوئرستین، نقش فعال آنتی‌اکسیدانی در بدن موجود زنده و خارج از آن دارند و می‌توانند به‌طور مستقیم با واکنش‌های اکسایش-کاهش و به‌طور غیرمستقیم با کلات‌کننده‌ها عمل کنند. روتین علاوه بر اثر آنتی‌اکسیدانی، آثار دارویی در خور توجهی نیز دارد (Kreft *et al.*, 2002).

در پژوهش حاضر، تاثیر غلظت‌های مختلف ماده شیمیایی سالیسیلیک اسید بر وزن تر و خشک اندام هوایی، مقدار کلروفیل، کاروتنوئید، مالون‌دی‌آلدهید، روتین، کوئرستین و فلاونوئید کل در گیاه فلفل (*Capsicum annuum* L.) بررسی شد. بنابراین، هدف کلی از پژوهش حاضر، به‌دست آوردن غلظت‌های مناسب سالیسیلیک اسید برای بهبود رشد و افزایش ترکیبات فلاونوئیدی از جمله روتین و کوئرستین در گیاه فلفل است که می‌تواند در صنایع داروسازی استفاده شوند.

مواد و روش‌ها

کشت گلدانی: بذرهای گیاه *C. annuum* L. در گلدان‌های حاوی ورمیکولیت کاشته شدند؛ سپس در وضعیت کنترل‌شده اتاق رشد، در دوره نوری ۱۶

به عوامل بیماری‌زا و تنش‌زا باعث می‌شود. اگرچه بیوسنتز سالیسیلیک اسید به‌خوبی شناخته نشده است، بررسی‌های گذشته پیشنهاد می‌کنند که گونه‌های اکسیژن فعال مانند هیدروژن پراکسید، بیوسنتز سالیسیلیک اسید را بر اثر عوامل بیماری‌زا تنظیم می‌کنند (Rao *et al.*, 2000).

سالیسیلیک اسید ترکیب فنلی شبه‌هورمونی و مولکول علامتی است که در پاسخ‌های گیاهان به عوامل محیطی نقش دارد. این ترکیب، افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و تاثیر بر تنفس و یکپارچگی غشاها را باعث می‌شود (Nazar *et al.*, 2011؛ Syeed *et al.*, 2011؛ Khan *et al.*, 2012). سالیسیلیک اسید می‌تواند به سرعت از نقطه اولیه استفاده به بافت‌های مختلف گیاه منتقل شود.

سالیسیلیک اسید بر برخی فرایندهای گیاهی موثر است؛ اما بر گل‌دهی، تولید گرما در گیاهان مناطق گرمسیری و توسعه مقاومت نسبت به بیماری بیشترین تاثیر را دارد (Lichtenthaler, 1987؛ Popova *et al.*, 1997). علاوه بر این، سالیسیلیک اسید هورمون تنظیم‌کننده درونی است که نقش آن در سازوکارهای دفاعی بر علیه استرس‌های زیستی و غیرزیستی به‌خوبی شناخته شده است (Szalai *et al.*, 1994؛ Yalpani *et al.*, 2000).

مدارک مهمی وجود دارد که ترکیبات فنلی نقش مهمی در تنظیم فرایندهای فیزیولوژیک متفاوت مانند رشد و نمو گیاه، جذب یون، گل‌دهی، میزان تکثیر، تولید مثل و مقدار آنتوسیانین و کلروفیل ایفا می‌کنند (Popova *et al.*, 1997). همچنین تیمار سالیسیلیک اسید کاهش سنتز اتیلن، ممانعت از غیرقطبی شدن غشاء،

(مدل Carry 50، شرکت Varian، استرالیا) در طول موج‌های ۶۴۶/۸، ۶۶۳/۲۰ و ۴۷۰ نانومتر خواننده و غلظت رنگیزه‌ها با رابطه‌های ۱ تا ۴ و برحسب میلی گرم بر گرم وزن تر محاسبه شد.

رابطه ۱ $Chla = (12.25 A663.2 - 2.79 A646.8)$

رابطه ۲ $Chlb = (21.21 A646.8 - 5.1 A663.2)$

رابطه ۳ $ChlT = chla + chlb$

رابطه ۴ $Car = [1000 A470 - 1.8 chla - 85.02 chlb] / 198$

در این رابطه‌ها، Chla، Chlb، ChlT و Car به ترتیب غلظت کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتنوئیدها (شامل کاروتن‌ها و گزانتوفیل‌ها) است.

سنجش میزان فلاونوئیدهای کل با روش جذب

اسپکتروفوتومتری: برای مقایسه این ترکیبات ۰/۱ گرم وزن تر برگ در ۱۰ میلی لیتر اتانول اسیدی (شامل الکل اتیلیک ۹۵ درصد و استیک اسید گلاسیال به نسبت ۹۹ به ۱) به خوبی ساییده و عصاره حاصل به مدت ۱۰ دقیقه در ۴۰۰۰ g سانتریفیوژ شد. محلول رویی جدا شد و به مدت ۱۰ دقیقه به آرامی در حمام آب گرم با دمای ۸۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شد؛ سپس شدت جذب آن با اسپکتروفومتر UV-Visible در سه طول موج ۲۷۰، ۳۰۰ و ۳۳۰ نانومتر خوانده شد. نمونه شاهد استفاده شده برای تنظیم دستگاه اسپکتروفومتر، اتانول اسیدی بود. مقدار فلاونوئید با ضریب خاموشی (ε) ۳۳ بر میلی مولار بر سانتی متر محاسبه شد (Krizek et al., 1998).

سنجش میزان فلاونوئیدها با روش کروماتوگرافی

مایع با کارایی زیاد (HPLC): روش HPLC، روش تجزیه‌ای سریع و کارآمد است. در پژوهش حاضر، برای مقایسه میزان فلاونوئیدهای برگ از این روش استفاده شد (Greenberg et al., 1996).

ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی به ترتیب با دمای بیشینه ۲۷ درجه سانتیگراد و کمینه ۲۳ درجه سانتیگراد، شدت نور $10^3 \times 15$ میکرومول فوتون بر متر مربع بر ثانیه و رطوبت ۷۵ درصد قرار داده شدند. همه گلدان‌ها هفته‌ای ۳ بار علاوه بر آب مقطر با محلول غذایی لانگ اشتون آبیاری شدند. پس از ۵ هفته، وقتی که گیاهان به مرحله ۳ تا ۴ برگی رسیدند، تیمار سالیسیلیک اسید اعمال شد.

تیمار سالیسیلیک اسید: ابتدا محلول‌هایی از سالیسیلیک اسید با غلظت‌های صفر، ۰/۱، ۰/۷، ۱/۵، ۳، ۶ و ۹ میلی مولار تهیه شدند؛ سپس برگ‌های ۳ و ۴ گیاهان پس از ۵ هفته رشد، به مدت یک هفته و به صورت یک روز در میان با محلول‌های بالا اسپری شدند؛ آنقدر که از انتهای برگ‌ها محلول جاری شد.

تعیین وزن تر و خشک اندام هوایی: پس از گذشت ۴۲ روز نمونه‌ها برداشت شد. پس از جدا کردن اندام هوایی به تعداد چهار عدد از هر تیمار، وزن هریک برحسب گرم با ترازوی با دقت ۰/۰۰۰۱ گرم (مدل BP211D، شرکت Sartorius، آلمان) اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری وزن خشک، اندام هوایی گیاه فلفل به مدت ۴۸ ساعت در آون با دمای ۷۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد. پس از خشک شدن کامل نمونه‌ها، وزن خشک آنها اندازه‌گیری شد.

سنجش میزان رنگیزه‌های فتوستنتز: اندازه‌گیری

مقدار رنگیزه‌های فتوستنتزی شامل کلروفیل a، b، کلروفیل کل و کاروتنوئیدها با روش Lichtenthaler (۱۹۸۷) انجام شد. ۰/۲ گرم از برگ‌های تازه گیاه با ۱۵ میلی لیتر استون ۸۰ درصد ساییده شد. پس از صاف کردن، جذب آن‌ها با دستگاه اسپکتروفوتومتر

سنجش مقدار روتین با روش HPLC: عصاره با روش بالا به دست آمد؛ سپس ۲۰ میکرولیتر از محلول حاصل با سرنگ هامیلتون به Injector دستگاه HPLC تزریق شد. جذب روتین در طول موج ۳۵۵ نانومتر خوانده و غلظت آن با نمودار استاندارد، محاسبه و برحسب میلی گرم بر گرم وزن تر ارائه شد (Kreft et al., 2002).

سنجش مقدار کوئرستین با روش HPLC: عصاره با روش یادشده به دست آمد؛ سپس ۲۰ میکرولیتر از محلول حاصل با سرنگ هامیلتون به Injector دستگاه HPLC تزریق شد. جذب کوئرستین در طول موج ۳۵۵ نانومتر خوانده شد؛ سپس غلظت کوئرستین با نمودار استاندارد، محاسبه و برحسب میلی گرم بر گرم وزن تر ارائه شد.

سنجش غلظت مالون‌دی‌آلدهید: اندازه‌گیری غلظت مالون‌دی‌آلدهید با روش Heath و Packer (۱۹۶۸) انجام شد. طبق این روش، ۰/۲ گرم از بافت تازه برگ‌ی توزین شد و در هاون چینی حاوی ۵ میلی‌لیتر تری کلرو استیک اسید ۰/۱ درصد ساییده و عصاره حاصل، به مدت ۵ دقیقه در ۱۰۰۰۰ g سانتریفیوژ شد. ۲۰ گرم تری کلرو استیک اسید و ۰/۵ گرم تیو باریتوریک اسید در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب حل شد؛ سپس ۴ میلی‌لیتر از این محلول (محلول ۲۰ درصد تری کلرو استیک اسید دارای ۰/۵ درصد تیو باریتوریک اسید) به ۱ میلی‌لیتر از مایع رویی حاصل از سانتریفیوژ اضافه شد. محلول حاصل به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۹۵ درجه سانتیگراد حمام آب گرم حرارت داده و بلافاصله در یخ، سرد شد. دوباره این محلول به مدت ۱۰ دقیقه در ۱۰۰۰۰ g سانتریفیوژ شد و سپس در یخ قرار داده و جذب آن در

روش تهیه عصاره گیاهی: مقدار ۰/۲ گرم از برگ تازه گیاه با ترازوی دقیق آزمایشگاهی توزین شد و در هاون چینی حاوی ۵ میلی‌لیتر متانول ۸۰ درصد (شامل متانول خالص و آب دوبار تقطیر به نسبت ۸۰:۲۰) به خوبی ساییده شد. عصاره حاصل به لوله آزمایش سریچ دار منتقل و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد یخچال قرار داده شد. پس از ۲۴ ساعت محتوای لوله آزمایش با کاغذ واتمن شماره ۱، صاف و محلول حاصل به مدت ۱۰ دقیقه در ۴۰۰۰ g سانتریفیوژ شد. مایع رویی حاصل از سانتریفیوژ در بشر کوچکی ریخته و روی اجاق برقی قرار داده شد. با به کار بردن جریان گاز ازت و حرارت ۵۰ درجه اجاق برقی، حجم محلول به ۰/۵ میلی‌لیتر رسانده شد. محلول غلیظ به دست آمده، با سرنگ به سطح ستون sep-Pak (مدل C18، شرکت varian، استرالیا) اضافه شد. فلاونوئیدها با دستگاه HPLC (مدل ۱۱۰۰، شرکت Agilent، آلمان) و با روش فاز معکوس تحلیل شدند. در این روش، از استون‌تریپل خالص و فسفریک اسید ۱ میلی‌مولار با سرعت جریان ۱ میلی‌لیتر بر دقیقه برای فاز متحرک استفاده شد. برای این تحلیل، دستگاه به ستون C18 (مدل 300 sb، شرکت Zorbax، آلمان) با ابعاد ۴/۵ × ۲۵۰ میلی‌متر و قطر منفذ ۵ میکرومتر مجهز بود. زمان بازداری فلاونوئیدها در وضعیت یادشده، ۳۴ دقیقه در نظر گرفته شد. گرادیان غیرخطی فاز متحرک، طبق برنامه به دستگاه داده شد. مطابق این روش، جذب فلاونوئیدهای رهاسده از ستون، در طول موج ۳۴۰ نانومتر خوانده شد. این دستگاه مستقیماً به رایانه‌ای متصل بود که پیک حاصل از تزریق نمونه را با نرم افزار Chemstation نمایش می‌داد.

در ۶۰۰ نانومتر خوانده و از این مقدار کسر شد. برای محاسبه غلظت این آلدهیدها از ضریب خاموشی معادل $10^2 \times 458$ بر میلی‌مولار بر سانتی‌متر استفاده شد (Meirs and Aharoni, 1992). این ضریب خاموشی، میانگین ضریب خاموشی پنج آلدهید یادشده است.

نتایج

اثر سالیسیلیک اسید بر وزن تر و خشک اندام هوایی: با توجه به شکل‌های A-1 و B، سالیسیلیک اسید در غلظت ۹ میلی‌مولار، کاهش وزن تر و خشک اندام‌های گیاه را نسبت به شاهد موجب شد؛ اما در غلظت‌های ۰/۷، ۱/۵ و ۳ میلی‌مولار، افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد مشاهده شد (جدول ۱).


طول موج ۵۳۲ نانومتر با اسپکتروفتومتر خوانده شد. در این طول موج، جذب کمپلکس قرمز تیو باریتوریک اسید-مالون‌دی‌آلدهید اندازه‌گیری شد. جذب بقیه رنگیزه‌های غیراختصاصی، در طول موج ۶۰۰ نانومتر تعیین و از این مقدار کسر شد. برای محاسبه غلظت مالون‌دی‌آلدهید از ضریب خاموشی معادل ۱۵۵ بر میلی‌مولار بر سانتی‌متر استفاده شد (Heath and Packer, 1968).

سنجش سایر آلدهیدها (پروپانال، بوتانال، هگزانال، هپتانال و پروپانال دی‌متیل استال): سنجش میزان این آلدهیدها مطابق روش قبل انجام شد؛ اما شدت جذب در طول موج ۴۵۵ نانومتر خوانده شد. جذب سایر رنگیزه‌های غیراختصاصی نیز

جدول ۱ - تجزیه واریانس اثر سالیسیلیک اسید بر وزن تر و خشک، کلروفیل، کاروتنوئید، مالون‌دی‌آلدهید، سایر آلدهیدها، فلاونوئید، روتین و کوئرستین در گیاه فلفل - * نشان‌دهنده معنی‌داری با استفاده از آزمون دانکن است.

میانگین مربعات


کوئرستین	روتین	سایر آلدهیدها	مالون‌دی‌آلدهید	فلاونوئید ۳۳۰	فلاونوئید ۳۰۰	فلاونوئید ۲۷۰	کاروتنوئید	کلروفیل کل	کلروفیل b	کلروفیل a	وزن خشک اندام هوایی	وزن تر اندام هوایی	درجه آزادی منابع تغییرات	تیمارهای سالیسیلیک اسید	ضریب تغییرات
۳۷۴/۱۵°	۱۹۱/۵۴°	۰/۰۰۱°	۰/۰۵۱°	۷۶/۹۰°	۶۵/۱۵°	۲۱۸/۳۹°	۰/۰۰۶°	۰/۲۸°	۰/۰۸۲°	۰/۰۲۲°	۰/۰۷۱°	۱/۱۳°	۶	تیمارهای سالیسیلیک اسید	درصد
۹/۱۱	۵/۳۰	۴/۴۹	۴/۴۸	۵/۱۱	۵/۳۷	۷/۲۲	۱۲/۵۲	۱۰/۴۵	۱۱/۶۶	۹/۷۷	۱۲/۸۷	۱۲/۹۱			




شکل ۱- اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر وزن تر (A) و خشک (B) اندام هوایی گیاه فلفل - مقادیر، میانگین ۴ تکرار \pm انحراف معیار است. حروف غیر مشترک، بیان‌کننده تفاوت معنی‌دار با استفاده از آزمون دانکن است.

نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری نشان دادند؛ اما در غلظت‌های ۶ و ۹ میلی‌مولار، کاهش معنی‌داری در مقدار آن‌ها نسبت به شاهد مشاهده شد.

اثر سالیسیلیک اسید بر میزان کلروفیل:
همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، مقدار کلروفیل a، b و کل گیاهانی که در غلظت‌های ۰/۷، ۱/۵ و ۳ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید قرار گرفته‌اند






شکل ۲- اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر مقدار کلروفیل a، b و کل در برگ گیاه فلفل - مقادیر، میانگین ۴ تکرار \pm انحراف معیار است. حروف غیر مشترک، بیان‌کننده تفاوت معنی‌دار با استفاده از آزمون دانکن است.

میلی مولار سالیسیلیک اسید نسبت به شاهد، به‌طور معنی‌داری افزایش و در غلظت‌های ۶ و ۹ میلی مولار، به‌طور معنی‌داری کاهش یافتند (شکل ۳).


اثر سالیسیلیک اسید بر میزان کاروتنوئید: نتایج
حاصل از اعمال تیمار سالیسیلیک اسید نشان دادند که مقدار کاروتنوئیدها در غلظت‌های ۰/۷، ۱/۵ و ۳



شکل ۳- اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر مقدار کاروتنوئید در برگ گیاه فلفل - مقادیر، میانگین ۴ تکرار \pm انحراف معیار است. حروف غیر مشترک، بیان‌کننده تفاوت معنی‌دار با استفاده از آزمون دانکن است.

غلظت ۹ میلی‌مولار، تفاوت معنی‌داری نسبت به شاهد مشاهده نشد. در طول موج ۳۳۰ نانومتر، غلظت فلاونوئید کل در تیمار با غلظت‌های ۰/۱، ۰/۷، ۱/۵ و ۳ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد؛ اما در غلظت ۶ و ۹ میلی‌مولار، تفاوت معنی‌داری نسبت به شاهد مشاهده نشد (شکل ۴).


اثر سالیسیلیک اسید بر میزان فلاونوئید کل: نتایج نشان دادند که در طول موج‌های ۲۷۰ و ۳۰۰ نانومتر، غلظت فلاونوئید کل در تیمار با غلظت‌های ۰/۱، ۰/۷، ۱/۵ و ۳ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید نسبت به شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. این افزایش در غلظت‌های ۰/۱، ۰/۷ و ۱/۵ میلی‌مولار نسبت به شاهد چشمگیر بود؛ اما در



شکل ۴- اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر غلظت فلاونوئید کل در (A) ۲۷۰، (B) ۳۰۰ و (C) ۳۳۰ نانومتر در برگ گیاه فلفل - مقادیر، میانگین ۴ تکرار \pm انحراف معیار است. حروف غیر مشترک، بیان‌کننده تفاوت معنی‌دار با استفاده از آزمون دانکن است.

نسبت به شاهد نشان داد. این افزایش در غلظت ۰/۱ میلی مولار چشمگیر بود.


اثر سالیسیلیک اسید بر میزان روتین: با توجه به شکل ۵، مقدار روتین در غلظت‌های ۰/۱، ۰/۷، ۱/۵، ۳ و ۶ میلی مولار سالیسیلیک اسید افزایش معنی داری



شکل ۵- اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر مقدار روتین در برگ گیاه فلفل - مقادیر، میانگین ۴ تکرار \pm انحراف معیار است. حروف غیرمشترک، بیان‌کننده تفاوت معنی دار با استفاده از آزمون دانکن است.

این افزایش در غلظت‌های ۰/۱ و ۰/۷ میلی مولار چشمگیر بود. مقدار کوئرستین در غلظت‌های ۳، ۶ و ۹ میلی مولار کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد (شکل ۶).


اثر سالیسیلیک اسید بر میزان کوئرستین: در غلظت‌های ۰/۱، ۰/۷ و ۱/۵ میلی مولار سالیسیلیک اسید، مقدار کوئرستین به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت.



شکل ۶- اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر مقدار کوئرستین در برگ گیاه فلفل - مقادیر، میانگین ۴ تکرار \pm انحراف معیار است. حروف غیرمشترک، بیان‌کننده تفاوت معنی دار با استفاده از آزمون دانکن است.

میلی مولار سالیسیلیک اسید، مقدار مالون‌دی‌آلدئید را به‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش دادند. در غلظت‌های ۰/۱ و ۰/۷ تفاوت معنی‌داری نسبت به شاهد مشاهده نشد (شکل ۷).


اثر سالیسیلیک اسید بر میزان مالون‌دی‌آلدئید: در گیاه تیمار شده با غلظت‌های ۱/۵ و ۳ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید، مقدار مالون‌دی‌آلدئید به‌طور معنی‌داری کاهش یافت؛ در حالی که غلظت‌های ۶ و ۹



شکل ۷- اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر مقدار مالون‌دی‌آلدئید در برگ گیاه فلفل - مقادیر، میانگین ۴ تکرار \pm انحراف معیار است. حروف غیر مشترک، بیان‌کننده تفاوت معنی‌دار با استفاده از آزمون دانکن است.

معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش یافت. علاوه بر این در غلظت‌های ۰/۱ و ۰/۷ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید، تفاوت معنی‌داری در مقدار سایر آلدئیدها نسبت به شاهد مشاهده نشد (شکل ۸).

اثر سالیسیلیک اسید بر میزان سایر آلدئیدها: مقدار سایر آلدئیدها در گیاه تیمار شده با غلظت‌های ۱/۵ و ۳ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید، به‌طور معنی‌داری کاهش یافت؛ در حالی که در تیمارهای ۶ و ۹ میلی‌مولار، به‌طور



شکل ۸- اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر مقدار سایر آلدئیدها در برگ گیاه فلفل - مقادیر، میانگین ۴ تکرار \pm انحراف معیار است. حروف غیر مشترک، بیان‌کننده تفاوت معنی‌دار با استفاده از آزمون دانکن است.

بحث

سالیسیلیک اسید مولکولی موثر است که گیاهان را نسبت به تنش‌های زیستی و غیرزیستی مقاوم می‌کند. بررسی‌ها نشان داده‌اند که تاثیر سالیسیلیک اسید به غلظت، نوع گیاه و مرحله‌ی نموی آن بستگی دارد. با وجود این، زمانی که در غلظت‌های زیاد استفاده می‌شود، عاملی سمی برای گیاه است که به مرگ آن منجر می‌شود (Kovacic et al., 2009). مثلاً وزن تر و خشک دانه‌رست‌های گندم در غلظت‌های اندک سالیسیلیک اسید، افزایش یافتند؛ اما در غلظت‌های زیاد، این شاخص‌ها کاهش نشان دادند (Hayat et al., 2005) که نتایج بررسی حاضر را تأیید می‌کنند. همچنین مشاهده شده است که سالیسیلیک اسید افزایش وزن تر و خشک را در گیاه بادنجه‌بویه باعث شده است (Pourakbar and Abedzadeh, 2014).

گزارش شده است که محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی کلروفیل a و b، کلروفیل کل و کاروتنوئیدها در غلظت‌های اندک سالیسیلیک اسید در باقلا افزایش یافته است؛ درحالی که غلظت‌های زیاد سالیسیلیک اسید، کاهش محتوای رنگیزه‌ها را در باقلا سبب شده است (Turkyilmaz et al., 2005). تأثیر سالیسیلیک اسید بر افزایش مقدار کلروفیل در سویا نیز ثابت شده است که علت آن کاهش سنتز اتیلن و تحریک دستگاه فتوسنتزی بیان شده است (Leslie and Romani, 1995; Zhao et al., 1988). شاید افزایش رنگیزه‌ها در پژوهش حاضر نیز به همین علت باشد. Sinha و همکاران (۱۹۹۳) گزارش کردند که تیمار با سالیسیلیک اسید، مقدار کلروفیل و کاروتنوئید را در برگ‌های ذرت افزایش داد. درمقابل، برخی

بررسی‌ها، کاهش مقدار کلروفیل دانه‌رست‌های گندم و ماش را در غلظت‌های زیاد سالیسیلیک اسید نشان دادند؛ زیرا گزارش شده است که سالیسیلیک اسید ممکن است تنش اکسیداتیو ایجاد کند و گیاهان مختلف به طور متفاوتی با این تنش مقابله می‌کنند (Moharekar et al., 2003). در بررسی حاضر، کاهش مقدار کلروفیل و کاروتنوئید در غلظت‌های زیاد سالیسیلیک اسید شاید به علت تجمع آب‌سزیک اسید در گیاه باشد؛ زیرا گزارش شده است که سالیسیلیک اسید، تجمع آب‌سزیک اسید را سبب می‌شود که خود به بسته شدن روزنه‌ها منجر می‌شود و به این ترتیب، کاهش کلروفیل و کاروتنوئیدها نیز توجیه می‌شوند (Sakhabutdinova et al., 2003).

فلاونوئیدها یکی از متنوع‌ترین ترکیبات طبیعی هستند که توانایی جذب رادیکال‌های آزاد را دارند. مشاهدات، ثابت می‌کنند که غلظت ۲۰ میکرومولار سالیسیلیک اسید، افزایش درخورتوجه مقدار فلاونوئیدها را در گیاه *Panax ginseng* باعث می‌شود (Ali et al., 2007; Yu et al., 2006). همچنین Zarinkamar و همکاران (۲۰۱۳) گزارش کردند که غلظت ۰/۱۲۵ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید، افزایش میزان فلاونوئیدهای کل و آپی‌ژنین را در اندام هوایی گیاه بابونه آلمانی نسبت به شاهد موجب شد. این گزارش‌ها با نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مبنی بر افزایش مقدار فلاونوئیدهای کل بر اثر غلظت‌های ۰/۱، ۰/۷، ۱/۵، ۳ و ۶ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید مطابقت دارد. از آنجا که سالیسیلیک اسید عاملی تنش‌زا است و کاربرد آن تولید طیف وسیع فلاونوئیدها را سبب می‌شود، وجود رابطه‌ای مستقیم بین تیمار سالیسیلیک

گیاه فلفل نیز در غلظت‌های اندک سالیسیلیک اسید، شاید نتیجه بهبود توانایی سلول در خنثی کردن رادیکال‌های آزاد حاصل از سازوکارهای متابولیک است؛ اما غلظت‌های زیاد سالیسیلیک اسید، تنش اکسیداتیو ایجاد کرد و افزایش مقدار مالون‌دی‌آلدهید را باعث شد.

جمع‌بندی

به‌طور کلی، نتیجه‌گیری می‌شود که تیمار سالیسیلیک اسید در غلظت‌های اندک، آثار مثبت و در غلظت‌های زیاد، آثار منفی بر رشد و نمو گیاه فلفل دارد. بنابراین، غلظت‌های زیاد سالیسیلیک اسید به غشاهای زیستی خسارت وارد می‌کنند که از تولید رادیکال‌های بیش از ظرفیت دفاعی گیاه بر اثر سالیسیلیک اسید ناشی می‌شود. همچنین تیمار سالیسیلیک اسید می‌تواند افزایش مقادیر ترکیبات دارویی روتین و کوئرستین را باعث شود. بررسی‌های بیشتری برای تعیین مقدار بهینه مصرف سالیسیلیک اسید در گیاهان کشاورزی لازم است تا بتوان از آن، هنگام تنش‌های اجتناب‌ناپذیر محیطی که کاهش‌دهنده محصول هستند، برای افزایش تولید استفاده کرد.

سپاسگزاری

نگارنده از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور به‌علت حمایت مالی از پژوهش حاضر، صمیمانه سپاسگزاری می‌کند.

اسید و مقدار فلاونوئیدها نتیجه‌گیری می‌شود. کوئرستین با داشتن یک گروه هیدروکسیل در حلقه B از اسکلت فلاونوئیدی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی بیشتری را نسبت به ترکیبات بدون این گروه دارد (Larsson, 1988; Rice-Evans *et al.*, 1997).

کوئرستین در پاسخ به تولید رادیکال‌های آزاد حاصل از تیمار سالیسیلیک اسید در سلول‌های گیاهی افزایش می‌یابد (Hideg and Vass, 1996). وجود روتین در نواحی رأسی ساقه‌ها گزارش شده است. برگ‌های جوان نیز به همین مقدار، روتین دارند (Kreft *et al.*, 2002). نتایج حاصل از پژوهش حاضر مبنی بر افزایش مقدار روتین و کوئرستین گیاه فلفل بر اثر تیمار سالیسیلیک اسید می‌تواند در صنعت داروسازی استفاده شود.

در گیاه قرار گرفته در غلظت‌های ۱/۵ و ۳ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید، مقدار مالون‌دی‌آلدهید و سایر آلدئیدها به‌طور معنی‌داری کاهش یافت؛ اما غلظت‌های ۶ و ۹ میلی‌مولار، مقدار آن‌ها را به‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش داد. معمولاً افزایش پراکسیداسیون لیپیدها، شاخص افزایش تنش اکسیداتیو در نظر گرفته می‌شود (Delong and Steffen, 1998). گزارش شده است که تیمار سالیسیلیک اسید، کاهش پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء را موجب می‌شود (Leslie and Romani, 1988). همچنین گزارش شده است که سالیسیلیک اسید، کاهش مالون‌دی‌آلدهید را در گیاه بادرنجبویه سبب می‌شود (Pourakbar and Abedzadeh, 2014). کاهش پراکسیداسیون لیپیدها در

منابع

Ali, M. B., Hahn, E. J. and Paek, K. Y. (2007) Methyl jasmonate and salicylic acid induced oxidative stress and accumulation of phenolics in *Panax ginseng* bioreactor root suspension cultures. *Molecules* 12: 607-621.

- Delong, J. M. and Steffen, K. L. (1998) Lipid peroxidation and α -tocopherol content in α -tocopherol-supplemented thylakoid membranes during UV-B exposure. *Environmental and Experimental Botany* 39: 177-185.
- Greenberg, B. M., Wilson, M. I., Gerhardt, K. E. and Wilson, K. E. (1996) Morphological and physiological responses of *Brassica napus* to ultraviolet radiation: photomodification of ribulose 1-5-bis phosphate carboxylase/oxygenase and potential acclimation processes. *Plant Physiology* 148: 78-85.
- Hayat, S., Fariduddin, Q., Ali, B. and Ahamad, A. (2005) Effect of salicylic acid on growth and enzyme activities of wheat seedlings. *Akadémiai Kiadó* 53: 433-437.
- Heath, R. L. and Packer, L. (1968) Photoperoxidation in isolated chloroplast. I. Kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation. *Archives of Biochemistry and Biophysics* 125: 189-198.
- Hideg, E. and Vass, I. (1996) UV-B induced free radical production in plant leaves and isolated thylakoid membranes. *Plant Science* 115: 251-260.
- Khan, M. I. R., Syeed, S., Nazar, R. and Anjum, N. A. (2012) An insight into the role of salicylic acid and jasmonic acid in salt stress tolerance. In: *Phytohormones and abiotic stress tolerance in plants* (Eds. Khan, N. A., Nazar, R., Iqbal, N. and Anjum, N. A.) 277-300. Springer, New York.
- Kovacik, J., Gruz, J., Backor, M., Strnad, M. and Repcak, M. (2009) Salicylic acid induced changes to growth and phenolic metabolism in *Matricaria chamomilla* plants. *Plant Cell Reports* 28: 135-143.
- Kreft, S., Štrukelj, B., Gaberščik, A. and Kreft, I. (2002) Rutin in buckwheat herbs grown at different UV-B radiation levels: comparison of two UV spectrophotometric and an HPLC method. *Journal of Experimental Botany* 53: 1801-1804.
- Krizek, D. T., Britz, S. J. and Mirecki, R. M. (1998) Inhibitory effects of ambient levels of solar UV-A and UV-B radiation on growth of cv. new red fire lettuce. *Physiologia Plantarum* 103: 1-7.
- Larsson, R. A. (1988) The antioxidants of higher plants. *Phytochemistry* 27: 969-978.
- Leslie, C. A. and Romani, R. J. (1988) Inhibition of ethylene biosynthesis by salicylic acid. *Plant Physiology* 88: 833-837.
- Lichtenthaler, H. K. (1987) Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. *Methods in Enzymology* 148: 350-382.
- Martens, S. and Mithofer, A. (2005) Flavones and flavone synthases. *Phytochemistry* 66: 2399-2407.
- Meirs, S. and Aharoni, N. (1992) Ethylene increased accumulation of fluorescent Lipid-peroxidation products detected during parsley by a newly developed method. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 117: 128-132.
- Moharekar, S. T., Lokhande, S. D., Hara, T., Tanaka, R., Tanaka, A. and Chavan, P. D. (2003) Effect of salicylic acid on chlorophyll and carotenoid contents of wheat and Moong seedlings. *Photosynthetica* 41: 315-317.
- Nazar, R., Iqbal, N., Syeed, S. and Khan, N. A. (2011) Salicylic acid alleviates decreases in photosynthesis under salt stress by enhancing nitrogen and sulfur assimilation and antioxidant metabolism differentially in two mungbean cultivars. *Journal of Plant Physiology* 168: 807-815.
- Popova, L., Pancheva, T. and Uzunova, A. (1997) Salicylic acid: properties, biosynthesis and physiological role. *Bulgarian Journal of Plant Physiology* 23(1-2): 85-93.

- Pourakbar, L. and Abedzadeh, M. (2014) Effects of UV-B and UV-C radiation on antioxidative enzymes activity of *Melissa officinalis* and influences of salicylic acid in UV-stress ameliorations. Iranian Journal of Plant Biology 21: 23-34.
- Rao, M. V., Koch, J. R. and Davis, K. R. (2000) Ozone: a tool for probing programmed cell death in plants. Plant Molecular Biology 44: 345-358.
- Rice-Evans, C. A., Miller, N. J. and Paganga, G. (1997) Antioxidant properties of phenolic compounds. Trends in Plant Science 2: 152-159.
- Sakhabutdinova, A. R., Fatkhutdinova, D. R., Bezrukova, M. V. and Shakirova, F. M. (2003) Salicylic acid prevents the damaging action of stress factors on wheat plants. Bulgarian Journal of Plant Physiology. Special Issue (): 314-319.
- Sinha, S. K., Srivastava, H. S. and Tripathi, R. D. (1993) Influence of some growth regulators and cations on inhibition of chlorophyll biosynthesis by lead in maize. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 51: 241-246.
- Syeed, S., Anjum, N. A., Nazar, R., Iqbal, N., Masood, A. and Khan, N. A. (2011) Salicylic acid mediated changes in photosynthesis, nutrients content and antioxidant metabolism in two mustard (*Brassica juncea* L.) cultivars differing in salt tolerance. Acta Physiologiae Plantarum 33: 877-886.
- Szalai, G., Tari, I., Janda, T., Pestenacz, A. and Paldi, E. (2000) Effects of cold acclimation and salicylic acid on changes in ACC and MACC contents in maize during chilling. Biologia Plantarum 43: 637-640.
- Turkyilmaz, B., Aktas, L. Y. and Güven, A. (2005) Salicylic acid induced some biochemical and physiological changes in *Phaseolus vulgaris* L. F. Ü. Fen ve Mühendisilik Bilimleri Dergisi 17: 319-326.
- Yalpani, N., Enyedi, A. J., Leon, J. and Raskin, I. (1994) Ultraviolet light and ozone stimulate accumulation of salicylic acid and pathogenesis related proteins and virus resistance in tobacco. Planta 193: 373-376.
- Yu, Z. Z., Fu, C. X., Han, Y. S., Li, Y. S., Li, Y. X. and Zhao, D. X. (2006) Salicylic acid enhances jaceosidin and syringing production in cell cultures of *Saussurea medusa*. Biotechnology Letter 28: 1027-1031.
- Zarinkamar, F., Abdollahzadeh, A., Sharifi, M. and Behmanesh, M. (2013) Effect of salicylic acid on flavonoids, apigenin, anthocyanin and carbohydrate in *Matricaria chamomilla* L. Iranian Journal of Plant Biology 17: 74-67 (in Persian).
- Zhao, H. J., Lin, X. W., Shi, H. Z. and Chang, S. M. (1995) The regulating effects of phenolic compounds on the physiological characteristics and yield of soybeans. Acta Agronomica Sinica 21: 351-355.